



INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE LE TEST DU TAPIS ROULANT

1. Repas léger.
2. Aucun café/thé, cigarettes, gomme nicorette ou nicotine transdermique 2 heures avant le test.
3. Arrêter les médicaments pour la pression artérielle et le coeur 48 heures avant le test à moins d'avis contraire (voir la liste ci-incluse).
4. NE PAS arrêter les anticoagulants tels COUMADIN/WARFARIN ou INSULINE.
5. Apporter des vêtements confortables pour l'exercice ainsi que des espadrilles ou des souliers avec semelles en caoutchouc.
6. Une douche est disponible.
7. Il n'y a aucuns effets secondaires reliés à ce test.
8. Vous pouvez conduire votre auto après le test.

LISTE DE MÉDICAMENTS

Acebutolol	Isoptin	Persantine
Adalat	Isordil	Pindolol
Alprenolol	Isosorbide Dinitrate	Plendil
Amlodipine	Isosorbide Mononitrate	Propranolol
Asasantine	Labetalol	Renedil
Atenolol	Lanoxin	Rhotral
Betaloc	Linsotalol	Sectral
Blocadren	Lopressor	Sotacor
Cardizem	Metoprolol	Sotalol
Chronovera	Minitran	Tenormin
Coradur	Monitan	Theo-Dur
Corgard	Nadolol	Theophylline
Coronox	Nifedipine	Tiazac
Diltiazem	Nitro-Bid	Timolol
Digoxin	Nitro-Dur	Trandate
Dipyridamole	Nitrol	Transderm
Felodipine	Nitrong	Trasicor
Imdur	Nitropaste	Verapamil
Inderal	Norvasc	Viagra
ISMO	Oxprenolol	Visken

Vous devez recommencer vos médicaments lorsque le test est terminé.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR PATIENTS DIABÉTIQUES QUI PRENNENT DE L'INSULINE

Vous devez continuer à prendre votre Insuline et suivre votre régime habituel.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LE TAPIS ROULANT AVEC THALLIUM

1. Ne rien prendre a manger ou boire sauf de l'eau 4 heures avant le test.
2. La première partie du test est faite l'avant midi et dure environ une heure.
3. La deuxième partie du test dure environ _ heure pendant l'après-midi. Vous ne pouvez pas manger entre les deux parties sauf si vous êtes diabétique.